

	T.C AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BAKIM İLKE VE UYGULAMALAR II DERSİ	Doküman No: NS-1123	
		İlk Yayın Tarihi:	16.03.2026
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
DOKÜMAN ADI: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM – ENTERAL BESLENME UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ			

Öğrencinin adı Soyadı:

Öğrenci No:

Öğrenci imzası :

Sor. Öğretim Elemanı:

Sor. Öğretim Elemanı imzası:

*Hatalı uygulamada puanlama yapılırken işlem basamak değerinin yarısı toplam puana dahil edilir.

ENTERAL BESLENME UYGULAMASI		UYGULADI		UYGULAMADI
Malzemeler: Eldiven, çam uçlu enjektör, beslenme seti, su, beslenme solüsyonu, kirli kabi				
Sıra	İŞLEM BASAMAKLARI	DOĞRU	HATALI	
1	Eller yıkanır.			
2	İşlem hastaya açıklanır.			
3	Hastanın başı en az 30 derece yükseltilir. Fowler ya da semi-fowler pozisyonu verilir.			
4	Sonda ucu altına su geçirmez örtü serilir.			
5	Eldivenler giyilir.			
6	Enjektör sondanın distal ucuna yerleştirilir.			
7	Sondanın klembi açılır.			
8	Tüpün midede olup olmadığı kontrol edilir.			
9	Enjektörle mide içeriği aspire edilir.			
10	Gelen içerik 100 ml’den az ise mide içeriği geri verilir, beslenme yapılır.			
11	Gelen içerik 100 ml’den fazla ise beslenme yapılmaz.			
12	Seçilen beslenme yöntemine göre besin solüsyonunun akış hızı ayarlanır ve kontrol edilir.			
	Besin beslenme torbası ile sürekli verilecekse:			
	❖ Beslenme setinin klembi kapatılır			
	❖ Torbanın üst kapağı açılarak beslenme solüsyonu boşaltılır ve kapağı kapatılır.			
	❖ Beslenme setinden solüsyonun akışı sağlanarak havası çıkarılır.			
	❖ Akış hızı ayarlanır ve kontrol edilir.			
	❖ Torba içindeki besin bitmek üzere iken içine 30-50 ml su ilave edilir.			
	Besin enjektör ile verilecekse:			
	❖ 15-20 ml su enjektöre çekilir.			
	❖ 30-35 cm yukarıdan su yavaş yavaş verilir.			
	❖ Enjektöre beslenme solüsyonu boşaltılır			
	❖ Enjektörün ucu sondanın distal ucuna takılır			
	❖ Enjektör 30-35 cm yukarı kaldırılır ve besin akışa bırakılır			
	❖ Enjektör tamamen boşalmadan besin eklenir.			
	❖ Beslenme işlemi bittikten sonra enjektörle 30-50 ml su verilerek tüpün temizlenmesi sağlanır.			
13	Sonda klemplenir.			
14	Enjektör ya da beslenme torbasının seti tüpten ayrılır.			
15	Hastanın başı en az 30 derecede 30-45 dk aynı pozisyonda kalması sağlanır.			
16	Kullanılan malzemeler kaldırılır.			
17	Eldiven çıkarılır, eller yıkanır.			
18	İşlem kaydedilir.			

➤ NOT: Uygulama basamak kat sayısı değeri 5,56’ dır.