

	T.C AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BAKIM İLKE VE UYGULAMALAR II DERSİ	Doküman No: NS-1127	
		İlk Yayın Tarihi:	16.03.2026
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
DOKÜMAN ADI: İLAÇ UYGULAMALARI – BURUNA İLAÇ UYGULAMA BECERİSİ			
ÖĞRENİM REHBERİ			

Öğrencinin adı Soyadı:

Sor. Öğretim Elemanı:

Öğrenci No:

Öğrenci İmzası :

Sor. Öğretim Elemanı imzası:

*Hatalı uygulamada puanlama yapılırken işlem basamak değerinin yarısı toplam puana dahil edilir.

BURUNA İLAÇ UYGULAMA		Uygulandı		Uygulanmadı
Malzemeler: Tedavi tepsisi içinde; İstem yapılan nazal sprey /damla, ilaç kartı, kağıt mendil, koruyucu örtü, temiz eldiven (en az 2 adet), atık malzemeler için atık kutusu/böbrek küvet		Doğru	Hatalı	
Sıra	İŞLEM BASAMAKLARI			
1	Hekim istemi kontrol edilir.			
2	Buruna ilaç uygulamayı etkileyecek faktörler değerlendirilir (yaş, bilinç durumu, burun ameliyatı v.s.).			
3	El hijyeni sağlanır.			
4	Uygulanacak ilaca ilişkin doğru ilkeler, ilacın sıcaklığı, son kullanma tarihi v.s. kontrol edilir.			
5	3 kontrol ilkesine göre istem edilen ilaç ve tedavi tepsisi hazırlanır			
6	Hastanın kimliği doğrulanır.			
7	Hastanın alerji durumu sorgulanır.			
8	Hastaya ilaç uygulamasına ilişkin bilgi verilir.			
9	Hastanın gizliliği açısından kapı, perde/paravan kapatılır.			
10	İlaç uygulaması öncesi hemşire gözlem formu ile ilaç kartı karşılaştırılır (6 doğru ilkesi).			
11	El hijyeni sağlanır.			
12	Hastanın üzerine koruyucu örtü örtülür.			
13	Eldivenler giyilir.			
14	Burun delikleri kontrol edilir.			
15	Herhangi bir kontrendikasyon yoksa hastadan burnunu sümkürerek temizlemesi istenir			
16	Hasta oturur pozisyonda iken omuzlarının üstüne ya da supine pozisyonunda iken başın altına yastık konularak baş hiperekstansiyona getirilir.			
17	Hastanın başı uygulanacak tarafın tersine doğru çevrilir.			
18	Hastadan ağzından nefes alması istenir.			
19	Pasif el ile başın pozisyonu korunurken aktif el ile damlalık burun deliğinin 1cm üzerinde tutulur.			
20	İstem edilen damla sayısı kadar ilaç, etmoid kemiğin orta hattına damlayacak şekilde doğru burun deliğine damlatılır.			
21	Hastanın 5 dakika kadar başı hiperekstansiyonda olacak şekilde kalması istenir.			
22	Eldivenler çıkarılır.			
23	Atıklar atık kutusuna alınır ve El hijyeni sağlanır.			
24	Gerçekleştirilen ilaç uygulamasına ilişkin bilgiler hemşire gözlem formuna uygun formatta (tarih-saat-paraf) kaydedilir.			
25	Hastanın ilaca olan yanıtı takip edilir ve değerlendirilir.			

➤ NOT: Uygulama basamak kat sayısı değeri 4' dür.