



T.C
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
.....BAKIM İLKE VE
UYGULAMALAR II DERSİ

Doküman No: NS-1128

İlk Yayın Tarihi: 16.03.2026

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

DOKÜMAN ADI: İLAÇ UYGULAMALARI – DERİYE İLAÇ UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ

Öğrencinin adı Soyadı:

Sor. Öğretim Elemanı:

Öğrenci No:

Öğrenci İmzası :

Sor. Öğretim Elemanı imzası:

*Hatalı uygulamada puanlama yapılırken işlem basamak değerinin yarısı toplam puana dahil edilir.

DERİYE İLAÇ UYGULAMA Malzemeler: Tedavi tepsisi içinde; İstem yapılan krem/ merhem/ losyon, ilaç kartı, istemi yapılan transdermal flaster, temiz eldiven, böbrek küvet. örtü-havlu		Uygulandı		Uygulanmadı
		Doğru	Hatalı	
Sıra	İŞLEM BASAMAKLARI			
1	Hekim istemi kontrol edilir.			
2	Deriye ilaç uygulamayı etkileyecek faktörler değerlendirilir (yaş, bilinç durumu, insizyon bölgesi, v.s.).			
3	El hijyeni sağlanır.			
4	Uygulanacak ilaca ilişkin doğru ilkeler, ilacın sıcaklığı, son kullanma tarihi v.s. kontrol edilir.			
5	3 kontrol ilkesine göre istem edilen ilaç ve tedavi tepsisi hazırlanır			
6	Hastanın kimliği doğrulanır.			
7	Hastanın alerji durumu sorgulanır.			
8	Hastaya ilaç uygulamasına ilişkin bilgi verilir.			
9	Hastanın gizliliği açısından kapı, perde/paravan kapatılır.			
10	İlaç uygulaması öncesi hemşire gözlem formu ile ilaç kartı karşılaştırılır (6 doğru ilkesi).			
11	El hijyeni sağlanır.			
12	Hastanın yatağı bel seviyesine getirilerek, yatak frenleri kapatılır ve çalışılacak taraf da bulunan yatak kenarlıkları indirilir			
13	El hijyeni sağlanarak tek kullanımlık eldivenler giyilir.			
14	Hastanın sadece uygulama yapılacak bölgesi açık kalacak şekilde kıyafetleri çıkarılır			
15	Uygulama yapılacak bölge gerekli ise temizlenir ve kurulanır.			
16	Transdermal flaster (TTS) kullanılacak ise; Temiz, kuru ve tüysüz bölge olmasına dikkat edilir. Önceden uygulanmış TTS var ise; Eski TTS çıkarılarak yapışkan kısımlar birbirine gelecek şekilde kapatılır, katlanarak tıbbi atık kutusuna atılır.			
17	Uygulanacak TTS'nin üzerine ilacın veriliş tarihi, saati ve uygulayan hemşirenin parafı yazılır			
18	Uygulanacak TTS'nin yapışkanlı-ilaçlı tarafına dokunulmadan, hasta üzerinde belirlenen bölgeye yapıştırılır.			
19	TTS'nin bölgeye yapıştırılırken avuç içi kullanılarak hafif bir basınçla 10 saniye bastırılır.			
20	Krem/merhem/losyon uygulanacak ise; Eldiven giyilir. Gereken miktarda ilaç avuç içine alınarak iki el birbirine sürtülerek ısıtılır. Isıtılan ilaç kıl büyüme yönüne doğru eşit bir şekilde yayılır.			
21	Eldivenler yenisi ile değiştirilerek,			
22	Aerosol sprey uygulanacaksa; • Sprey kutusu çalkalanır. • Sprey uygulama yapılan bölgenin 15-30 cm uzağında tutulur. • Sprey hastanın göğüs ya da boyun bölgesine uygulanacak ise; • Hastanın yüzünü diğer tarafa çevirmesi istenir ya da hastanın yüzü bir örtü/havlu ile kapatılır. • Sprey orantılı olarak sıkılır.			
23	Eldivenler çıkarılır.			
24	Hastaya rahat edeceği pozisyon verilir.			
25	Atıklar atık kutusuna alınır.			
26	El hijyeni sağlanır.			
27	Gerçekleştirilen ilaç uygulamasına ilişkin bilgiler hemşire gözlem formuna uygun formatta (tarih-saat-paraf) kaydedilir.			
28	Hastanın ilaca olan yanıtı takip edilir ve değerlendirilir.			

➤ NOT: Uygulama basamak kat sayı değeri 3,57' dir.