



T.C
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

..... **BAKIM İLKE VE UYGULAMALAR II**
DERSİ

Doküman No: NS-1129

İlk Yayın Tarihi: 16.03.2026

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

DOKÜMAN ADI: İLAÇ UYGULAMALARI – GÖZE İLAÇ UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ

Öğrencinin adı Soyadı:

Sor. Öğretim Elemanı:

Öğrenci No:

Öğrenci İmzası :

Sor. Öğretim Elemanı imzası:

*Hatalı uygulamada puanlama yapılırken işlem basamak değerinin yarısı toplam puana dahil edilir.

GÖZE İLAÇ UYGULAMA Malzemeler: Tedavi tepsisi içinde; istem yapılan steril göz damlası/ pomadı, ilaç kartı, serum fizyolojik, 10 cc'lik enjektör, steril gaz bezi (en az 2 adet), kağıt mendil, koruyucu örtü, temiz eldiven(en az 2 adet), atık malzemeler için atık kutusu/böbrek küvet		Uygulandı		Uygulanmadı
		Doğru	Hatalı	
Sıra	İŞLEM ÖNCESİ HAZIRLIK			
1	Hekim istemi kontrol edilir.			
2	Göze ilaç uygulamayı etkileyecek faktörler değerlendirilir (yaş, bilinç durumu, göz ameliyatı durumu v.s.).			
3	El hijyeni sağlanır.			
4	Uygulanacak ilaca ilişkin doğru ilkeler, ilacın sıcaklığı, son kullanma tarihi v.s. kontrol edilir.			
5	3 kontrol ilkesine göre istem edilen ilaç ve tedavi tepsisi hazırlanır.			
6	Hastanın kimliği doğrulanır.			
7	Hastanın alerji durumu sorgulanır.			
8	Hastaya ilaç uygulamasına ilişkin bilgi verilir.			
9	Hastanın gizliliği açısından kapı, perde/paravan kapatılır.			
10	İlaç uygulaması öncesi hemşire gözlem formu ile ilaç kartı karşılaştırılır (6 doğru ilkesi).			
11	El hijyeni sağlanır.			
12	Hastanın üzerine koruyucu örtü örtülür.			
13	Hastaya supine ya da fowler pozisyonunda iken başı ekstansiyona getirilir.			
14	Eldiven giyilir.			
15	Gözde çapaklanma, akıntı varsa; Steril spançlar 10cc'lik enjektöre serum fizyolojik çekilerek ıslatılır. Serum fizyolojik ile ıslatılmış steril spançlarla gözler iç kantüsten dış kantüse olacak şekilde temizlenir.			
16	İlacın kapağı açılır ve ilaç şişesi aktif ele alınır.			
17	Göz damlası uygulanacak ise; İlacın damlalık kısmına gerekli miktarda ilacın gelmesi sağlanır. Damlalık kullanılacak ise damlalığa gerekli miktarda ilaç çekilir.			
18	Konjektivayı ortaya çıkarmak için; Pasif el ile alt göz kapağının altına spanç yerleştirilir, elmacık kemiği üzerine konur ve aşağıya doğru çekilir.			
19	Bireyin gözünü açık tutması, yukarıya ve geriye doğru bakması istenir.			
20	Aktif elin ulnar kısmı hastanın alnına yerleştirilir. İlaç şişesinin damlalık ucu hastanın alt konjunktiva kesesinden 1-2 cm yukarıda tutulur.			
21	İstem edilen miktarda ilaç alt konjunktiva kesesi içerisine uygulanır.			
22	Hastanın alt göz kapağı serbest bırakılır.			
23	Hastadan gözünü kapatması istenir.			
24	Göz kapağının dışına çıkan ilaç varsa kağıt havlu ile temizlenir.			
25	İlacın özelliğine göre; nazolakrimal kanal üzerine gazlı bez yerleştirilerek en az 30 sn. hafifçe basınç uygulanır.			
26	Göz pomadı uygulanacak ise; Konjektivayı ortaya çıkarmak için; Pasif el ile alt göz kapağının altına spanç yerleştirilir, elmacık kemiği üzerine konur ve aşağıya doğru çekilir			
27	Bireyin gözünü açık tutması, yukarıya ve geriye doğru bakması istenir.			
28	Tüpün ucu alt göz kapağına ve kirpiklere değdirilmeden konjunktiva kesesinin iç tarafına, iç kantüsten dış kantüse doğru pomad sürülür.			
29	Hastanın alt göz kapağı serbest bırakılır.			
30	Hastadan gözünü kapatması ve gözünü hareket ettirmesi istenir.			
31	Atıklar atık kutusuna alınır. Eldivenler çıkarılır. El hijyeni sağlanır.			
32	Hastaya uygun pozisyon verilir.			
33	Gerçekleştirilen ilaç uygulamasına ilişkin bilgiler hemşire gözlem formuna uygun formatta (tarih-saat-paraf) kaydedilir.			
34	Hastanın ilaca olan yanıtı takip edilir ve değerlendirilir.			

➤ NOT: Uygulama basamak kat sayısı değeri 2,94' dür.

