

	T.C AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BAKIM İLKE VE UYGULAMALAR II DERSİ	Doküman No: NS-1132	
		İlk Yayın Tarihi:	16.03.2026
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
DOKÜMAN ADI: İLAÇ UYGULAMALARI – ÖLÇÜLÜ DOZ İNHALER İLAÇ UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ			

Öğrencinin adı Soyadı:

Sor. Öğretim Elemanı:

Öğrenci No:

Öğrenci İmzası :

Sor. Öğretim Elemanı imzası:

*Hatalı uygulamada puanlama yapılırken işlem basamak değerinin yarısı toplam puana dahil edilir.

ÖLÇÜLÜ DOZ İNHALER İLAÇ UYGULAMA		Uygulandı		Uygulanmadı
Malzemeler: Tedavi tepsisi içinde; İstem yapılan ilaç (ölçülü doz inhaler), ilaç kartı ,bir bardak su, böbrek küvet, el antiseptiği,				
Sıra	İŞLEM BASAMAKLARI	Doğru	Hatalı	
1	Hekim istemi kontrol edilir.			
2	İnhaler ilaç uygulamasını etkileyen faktörler belirlenir(alerji, yaş, bilinç durumu, dispne v.s.)			
3	El hijyeni sağlanır.			
4	Uygulanacak ilaca ilişkin doğru ilkeler, ilacın sıcaklığı, son kullanma tarihi v.s. kontrol edilir.			
5	3 kontrol ilkesine göre istem edilen ilaç ve tedavi tepsisi hazırlanır			
6	Hastanın kimliği doğrulanır.			
7	Hastanın alerji durumu sorgulanır.			
8	Hastaya ilaç uygulamasına ilişkin bilgi verilir.			
9	Hastanın gizliliği açısından kapı, perde/paravan kapatılır.			
10	İlaç uygulaması öncesi hemşire gözlem formu ile ilaç kartı karşılaştırılır (6 doğru ilkesi).			
11	El hijyeni sağlanır.			
12	Hastaya fowler pozisyonu verilir			
13	İnhalerin kapağı çıkartılır.			
14	İnhaler 2-5 sn (5-6 kez) çalkalanır.			
15	Hastadan derin bir nefes alıp nefesini tamamen vermesi istenir.			
16	Hastadan inhaleri ağızına yerleştirip, dudaklarını sıkıca kapatması istenir.			
17	Hastadan ağızdan yavaş ve derin bir şekilde nefes alırken (3-5 sn)aynı anda ilacı püskürtmesi istenir(başparmağı inhalerin ağız hizasındaki kısmını, işaret parmağı ile de üst kısmını tutması sağlanır).			
18	İnhaler ağızdan çıkarılır.			
19	Hastadan nefesini yaklaşık 10 sn tutması istenir			
20	Hastanın nefesini dudaklarının arasından ya da burun yoluyla yavaşça nefes vermesi istenir.			
21	Hastadan inhaler kullanımının ardından su ile gargara yapması istenir			
22	Bir sonraki ilaç dozunu püskürtmeden önce 20-30 sn, başka bir ilaç uygulanacak ise 2-5 dk beklemesi sağlanır/istenir.			
23	İnhalerin kapağı kapatılır.			
24	El hijyeni sağlanır.			
25	Gerçekleştirilen ilaç uygulamasına ilişkin bilgiler hemşire gözlem formuna uygun formatta (tarih-saat-paraf) kaydedilir.			
26	Hastanın ilaca olan yanıtı takip edilir ve değerlendirilir.			

➤ NOT: Uygulama basamak kat sayı değeri 3,85' dir.