



T.C
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

..... **BAKIM İLKE VE UYGULAMALAR**
II DERSİ

Doküman No: NS-1134

İlk Yayın Tarihi: 16.03.2026

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

DOKÜMAN ADI: İLAÇ UYGULAMALARI – VAJİNAYA İLAÇ UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ

Öğrencinin adı Soyadı:

Sor. Öğretim Elemanı:

Öğrenci No:

Öğrenci İmzası :

Sor. Öğretim Elemanı imzası:

*Hatalı uygulamada puanlama yapılırken işlem basamak değerinin yarısı toplam puana dahil edilir.

VAJİNAYA İLAÇ UYGULAMA Malzemeler: Tedavi tepsisi içinde; İstem yapılan vajinal ilaç, supizotuvar/köpük/jel/ gerekli ise ilaç aplikatörü, ilaç kartı, suda eriyen kayganlaştırıcı jel, kağıt mendil, suya dayanıklı koruyucu örtü, temiz eldiven(en az 2 adet), perianal ped atık malzemeler için atık kutusu/böbrek küvet		Uygulandı		Uygulanm adı
		Doğru	Hatalı	
Sıra	İŞLEM BASAMAKLARI			
1	Hekim istemi kontrol edilir.			
2	Dış genital organlar ve vajinal kanama durumu kontrol edilir			
3	El hijyeni sağlanır.			
4	Uygulanacak ilaca ilişkin doğru ilkeler, ilacın sıcaklığı, son kullanma tarihi v.s. kontrol edilir.			
5	3 kontrol ilkesine göre istem edilen ilaç ve tedavi tepsisi hazırlanır			
6	Hastanın kimliği doğrulanır.			
7	Hastanın alerji durumu sorgulanır.			
8	Hastaya ilaç uygulamasına ilişkin bilgi verilir.			
9	Hastanın gizliliği açısından kapı, perde/paravan kapatılır.			
10	Hastanın tuvalet ihtiyacını gidermesi istenir.			
11	İlaç uygulaması öncesi hemşire gözlem formu ile ilaç kartı karşılaştırılır (6 doğru ilkesi).			
12	El hijyeni sağlanır.			
13	Hastanın abdominal bölgesi ve alt ekstermitesini örtülür.			
14	Hastanın alt kıyafetleri çıkartılır.			
15	Hastaya altına yatak koruyucu örtü serilir.			
16	Hastaya dorsal rekümbent pozisyonu verilir. Dizlerinde ya da kalçalarında fiziksel engeli olan hastalara supine pozisyonu verilir			
17	Eldivenler giyilir.			
18	Gerekli ise perine temizliği sağlanır ve eldivenler değiştirilir.			
19	Vajinal supizotuvar uygulanacak ise; • Supizotuvar paketinden çıkartılır ve aktif elin işaret parmağı ve supizotuvarın yuvarlak kısmına kayganlaştırıcı jel sürülür. • Pasif el ile labia majörler yukarıya doğru ve geriye doğru açılır. • Aktif el ile supizotuvarın yuvarlak ucu önde olacak şekilde vajinal açıklıktan işaret parmağı yardımıyla yaklaşık 7,5-10 cm kadar itilir.			
20	Vajinal aplikatör ile ilaç uygulanacaksa; • Vajinal aplikatör istem edilen miktarda krem/topik ile doldurulur • Aplikatörün ucuna suda eriyen kayganlaştırıcı sürülür. • Pasif el ile labialar ayrılır. • Aktif el ile aplikatörün ucu yavaşça ve hafifçe döndürülerek vajinal açıklıktan 7,5-10 cm ilerletilir. • Pasif el ile ilaç bitene kadar aplikatörün pistonu itilir • Aplikatör yavaşça vajinal açıklıktan geriye doğru çekilerek çıkarılır.			
21	Kağıt havlu/ ped ile perine bölgesindeki kayganlaştırıcı artıkları temizlenir.			
22	Hastaya sonrasında perine bölgesini temizlemesi için ped/kağıt havlu verilir.			
23	Hastanın 10 dakika supine pozisyonunda kalması sağlanır			
24	Hastanın 10 dakika supine pozisyonunda kalması sağlanır			
25	Atıklar atık kutusuna alınır ve Hastanın alt kıyafetlerini giymesi sağlanır.			
26	El hijyeni sağlanır.			
27	Gerçekleştirilen ilaç uygulamasına ilişkin bilgiler hemşire gözlem formuna uygun formatta (tarih-saat-paraf) kaydedilir.			
28	Hastanın ilaca olan yanıtı takip edilir ve değerlendirilir.			

➤ NOT: Uygulama basamak kat sayı değeri 3,57' dir.